

The background of the image is a scenic landscape. In the foreground, there are dark, silhouetted mountains. Above the mountains, the sky is filled with large, billowing clouds. The sky is a mix of warm orange and yellow tones, suggesting a sunset or sunrise. The overall mood is serene and natural.

Angélica
Sánchez


TCU 468

AGRICULTURA
ORGÁNICA

CABALLOS

ALIMENTACIÓN PRINCIPAL SON
FORRAJES.

SON FERMENTADORES
POSTGÁSTRICOS, QUE QUIERE
DECIR QUE FERMETA EL
ALIMENTO EN EL INTESTINO
GRUESO

The background features a stylized illustration of a person riding a horse. The rider is wearing a hat and a long coat, and the horse is depicted in a dynamic, galloping pose. The entire scene is set against a solid mustard yellow background. In the top left corner, there are stylized blue and pink leaves. In the top right corner, there is a large, textured, brown crescent moon and two small yellow stars. In the bottom left corner, there are stylized orange and pink flowers.

LA RELACIÓN ENTRE EL
FORRAJE Y EL ALIMENTO
BALANCEADO DEBE
ESTAR DE ACUERDO AL
ANIMAL Y AL TIPO DE
ACTIVIDAD QUE REALIZA.
SIN EMBARGO, NO SE
DEBEN ALIMENTAR SOLO
CON ALIMENTO
BALANCEADO,
NECESITAN FIBRA.

HAY TABLAS PARA MEDIR
CONDICIÓN CORPORAL,
SIENDO 0 DESNUTRIDO Y 5
OBESO. LOS CABALLOS EN
CUADRAS NECESITAN
EJERCITARSE PARA EVITAR
LLEGAR A UN 5. PERO BIEN
ALIMENTADO PARA NO ESTAR
EN 0.



- LOS ESTABLOS DEBEN SER DE MÍNIMO 3X3 METROS.
- EL SOL NO INCIDE DENTRO DEL ESTABLO, POR LO QUE NO GENERA ESTRÉS CALÓRICO.
- IDEALMENTE SON SEMI CERRADOS PARA QUE ENTRE AIRE FRESCO Y PARA MANTENER EL CONTACTO CON LOS OTROS CABALLOS.



EL CABALLO
REPRODUCTOR DEBE SER
ELEGIDO POR EDAD,
TEMPERAMENTO, LIBIDO Y
CONFORMACIÓN
CORPORAL.



LAS HEMBRAS SE PREÑAN A
LOS 3 AÑOS PARA NO
COMPROMETER EL
CRECIMIENTO. TIENEN UN
CICLO ESTRAL DE 21 DÍAS Y EL
CELO DURA 6,5 DÍAS EN
PROMEDIO. LA GESTACIÓN
DURA 11 MESES Y 11 DÍAS.



EL POTRO NACE Y DEBE
TOMAR 2 LITROS DE
CALOSTRO EN LAS
PRIMERAS 6-8 HORAS DE
VIDA. SI ES UN POTRO
HUÉRFANO SE UTILIZA
LECHE DE CABRA COMO
SUSTITUTO YA QUE LA
LECHE DE VACA TIENE
MUCHA GRASA. SE
DESTETA A LOS 6 MESES.




- POR HIGIENE LA CAMA CON EL ESTIÉRCOL SE DEBE CAMBIAR TODOS LOS DÍAS.
- SE REALIZA DESPARASITACIÓN INTERNA CADA 3 MESES Y EXTERNA CADA 4 MESES.
- EL CAMBIO DE HERRAJE CADA 5-6 SEMANAS.



COMPOST



LAS CAMAS SE
MEZCLAN CON
AGUA, TIERRA,
LEVADURAS,
MELAZA, PLANTAS O
RESIDUOS DEL HENO,
Y UREA. SE REMUEVE
3 VECES POR
SEMANA Y EL
COMPOSTAJE ESTARÁ
LISTO DE 3-8
SEMANAS.



REFERENCIAS

- ACERO, P. S.F. PLANIFICACIÓN Y MANEJO DE LA EXPLOTACIÓN EQUINA. DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS AGRARIAS Y MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES. VALLADOLID, ESPAÑA.
- ALARCÓN, B. 2014. MANUAL DE PRÁCTICAS DE ZOOTECNIA DE EQUINOS. UNIVERSIDAD VERACRUZANA. VERACRUZ, MÉXICO.
- BOETA, M.; DÍAZ, M.; HAYEN, S. S.F. MANUAL DE LA PRÁCTICA DE PROFUNDIZACIÓN EN REPRODUCCIÓN EQUINA. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.
- BOMBIK, E.; BOMBIK, T.; FRANKOWSKA, A. 2011. EVALUATION OF SELECTED PARAMETERS OF HORSE STABLING ENVIRONMENT IN BOX-STALL STABLES. ACTA SCI. POL., ZOOTECHNICA 10 (4) 2011, 13–22
- CAMPABADAL, C. 2012. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CABALLOS. ASOCIACIÓN AMERICANA DE SOYA.
- CINTORA, I. 2005. REPRODUCCIÓN EQUINA. SITIO ARGENTINO DE PRODUCCIÓN ANIMAL.
- ESPINOZA, A.; VENEGAS, D. 2015. MANUAL DE MANEJO SANITARIO PARA EQUINOS DE NICARAGUA. UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA. MANAGUA, NICARAGUA.
- FERRIS, G. S.F. ABONADO DE ESTIÉRCOL DE CABALLO. CONCILIO DE DISTRITOS DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS DEL ÁREA DE LA BAHÍA. CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.
- GENOUD, J. 2011. ALIMENTACIÓN EN EL CABALLO. SITIO ARGENTINO DE PRODUCCIÓN ANIMAL.
- IGLESIAS, L. 1994. EL ESTIÉRCOL Y LAS PRÁCTICAS AGRARIAS RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE. MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN. MADRID, ESPAÑA.
- LEÓN, P. S.F. MANEJO Y CUIDADO DEL CABALLO. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA INEA. VALLADOLID, ESPAÑA.
- MÁRQUEZ, C.; ESCOBAR, A.; TADICH, TA. 2010. CARACTERÍSTICAS DE MANEJO Y CONDUCTA EN CABALLOS ESTABULADOS EN EL SUR DE CHILE: ESTUDIO PRELIMINAR. ARCH MED VET 42, 203–207.

MARTÍNEZ, A. 2007. NUTRICIÓN DE CABALLOS DE OCIO ALIMENTADOS A PESEBRE. DPTO. DE PRODUCCIÓN ANIMAL, UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. ARGENTINA.

MUÑOZ, I. 2009. MANEJO DEL RECIÉN NACIDO EN EQUINOS. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA “ANTONIO NARRO”. COAHUILA, MÉXICO.

ORTUÑO, L. 2020. MANUAL BIENESTAR EQUINO. COSTA RICA EQUINE WELFARE.

PÉREZ, P. 1995. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DEL CABALLO (EN LÍNEA).

CONSULTADO EL: 15/05/2021. DISPONIBLE EN:

[HTTP://WWW.UCV.VE/FILEADMIN/USER_UPLOAD/FACULTAD_AGRONOMIA/ALIMENTACION_DE_EQUINOS.PDF](http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_agronomia/alimentacion_de_equinos.pdf)

PIÑANELI, M. S.F. AVANCES EN EL MANEJO DE LA NUTRICIÓN EQUINA (EN LÍNEA). CONSULTADO EL: 12/05/2021. DISPONIBLE EN:

[HTTPS://WWW.BIOTECNICAS.COM.AR/CONTENIDO/CAPACITACIONES/1545092821.PDF](https://www.biotecnicas.com.ar/contenido/capacitaciones/1545092821.pdf)

RAMÍREZ, J. 2006. DETERMINACIÓN DEL FOTOPERÍODO SOBRE LA ACTIVIDAD OVÁRICA EN YEGUAS DURANTE EL AÑO, EN DIFERENTES HARAS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA. UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

SOLANO, G.; WINGCHING, R. 2018. ESTRUCTURA DE HATO Y MANEJO NUTRICIONAL, SANITARIO, REPRODUCTIVO Y AMBIENTAL DEL CABALLO IBEROAMERICANO EN COSTA RICA. UNED RESEARCH JOURNAL (ISSN DIGITAL: 1659-441X) VOL. 10(2): 428-434.

SOTO, A. 2013. EVALUACIÓN DEL USO DE PELLETS DE STYLOSANTHES MULTILÍNEA EN EQUINOS. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. SAN JOSÉ, COSTA RICA.

TOPCZEWSKA, J.; ROGOWSKA, A. 2017. ASSESSMENT OF HOUSING CONDITIONS IN SELECTED HORSE STABLES. SCIENTIFIC ANNALS OF POLISH SOCIETY OF ANIMAL PRODUCTION - VOL. 13 (2017), NO 4, 67-75.